

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ

Β. Περιτογιάννης¹, Φ. Τσόλη¹, Π. Γιώτη¹, Μ. Μπακόλα², Ε. Γελαστοπούλου²

1. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου
2. Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Τομέας Δημόσιας Υγείας



Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

31^ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχιατρικής
www.psychiatriccongress.gr

25-28 Μαΐου 2023
Ξενοδοχείο Rodos Palace **Ρόδος**

Γραμμάτιο Συνεδρίου
Global Events
www.globalevents.gr



Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

31^ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχιατρικής

www.psychiatriccongress.gr

25-28 Μαΐου 2023
Ξενοδοχείο Rodos Palace **Ρόδος**

Γραμματεία Συνεδρίου
Global Events
www.global-events.gr



Σκοπός: Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα πως η χρησιμοποίηση των ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς δράσης (ΕΑΜΔ) πλεονεκτεί έναντι της θεραπείας από του στόματος. Ελάχιστες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί σε ασθενείς που διαμένουν σε περιοχές της επαρχίας. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της χρήσης των ΕΑΜΔ σε κλινικό πληθυσμό ασθενών με σχιζοφρένεια και συναφείς ψυχώσεις στην ελληνική επαρχία.

Υλικό και μέθοδος:
Ανακτήθηκαν δεδομένα από τους ιατρικούς φακέλους όλων των ασθενών με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας που παρακολουθούνταν σε τακτική βάση από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας στην Ήπειρο.

Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 87 ασθενείς (59 άντρες) με μέση ηλικία τα 54,4 έτη και μέση διάρκεια νόσου τα 28 έτη. Οι περισσότεροι (72,4%) λάμβαναν μονοθεραπεία με αντιψυχωτικά, ενώ σχεδόν 30% λάμβαναν ΕΑΜΔ, κυρίως δεύτερης γενιάς (20 από 26 ασθενείς, 76,9%). Η θεραπεία περιελάμβανε χορήγηση βενζοδιαζεπινών στο ένα-τρίτο των ασθενών και αντικαταθλιπτικά στο ένα-τέταρτο αυτών. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της μορφής αντιψυχωτικής θεραπείας (ΕΑΜΔ ή από του στόματος) και των κλινικών και δημογραφικών μεταβλητών που εξετάστηκαν (ηλικία, διάρκεια νόσου, ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ/ουσιών, νοσηλείες, συγχορήγηση βενζοδιαζεπινών ή αντικαταθλιπτικών). Μοναδική εξαίρεση ήταν το φύλο, καθώς οι γυναίκες ασθενείς ήταν πιο πιθανό να λαμβάνουν ΕΑΜΔ.

Table 1. Patients' demographic and clinical characteristics.

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------|
| Age (years, mean \pm SD) | | 54.4 \pm 12.1 | |
| Illness duration (years, mean \pm SD) | | 28.0 \pm 14.4 | |
| Hospitalizations (mean \pm SD) | | 3.4 \pm 4.5 | |
| Follow-up duration (years, mean \pm SD) | | 7.0 \pm 4.9 | |
| | | n | % |
| Antipsychotic medication | Oral | 61 | 70.1 |
| | LAI | 26 | 29.9 |
| Biological sex | Female | 28 | 32.2 |
| | Male | 59 | 67.8 |
| Treatment regimen | Monotherapy | 63 | 72.4 |
| | Combination | 24 | 27.6 |
| History of alcohol/substance abuse | No | 61 | 70.1 |
| | Yes | 26 | 29.9 |
| Carer | No | 19 | 21.8 |
| | Yes | 54 | 62.1 |
| | Family with other patients with SMI | 14 | 16.1 |
| Benzodiazepines | No | 58 | 66.7 |
| | Yes | 29 | 33.3 |
| Antidepressants | No | 65 | 74.7 |
| | Yes | 22 | 25.3 |

LAI: long-acting injectables; SMI: severe mental illness.

Table 3. Comparisons of patients on oral antipsychotic treatment and on LAI treatment.

| | Patients on Oral Antipsychotics (n = 61) | Patients on LAI (n = 26) | Statistical Test | <i>p</i> |
|---|---|-----------------------------|---------------------|----------|
| Age (years, mean, SD) | 54.3 (12.9) | 54.6 (10.4) | t(85) = -0.112 | NSS |
| Biological sex (male/female) | 46/15 | 13/13 | $\chi^2(1) = 5.393$ | 0.02 |
| Illness duration (years, mean, SD) | 27.6 (15) | 28.8 (13.8) | t(85) = -0.338 | NSS |
| Hospitalizations (mean, SD) | 3.7 (5.2) | 2.7 (2.2) | t(85) = 0.975 | NSS |
| History of alcohol/substance abuse | 17 | 9 | $\chi^2(1) = 0.396$ | NSS |
| Follow-up duration (years, mean, SD) | 7.1 (4.7) | 6.8 (5.5) | t(85) = 0.260, | NSS |
| Monotherapy vs. antipsychotic combination | 46 vs. 15 | 17 vs. 9 | $\chi^2(1) = 0.917$ | NSS |
| Concomitant benzodiazepine | 24 | 5 | $\chi^2(1) = 3.319$ | NSS |
| Concomitant antidepressant | 19 | 3 | $\chi^2(1) = 3.710$ | NSS |

NSS: not statistically significant.




Figure 1. Percentage distribution of biological sex per group of antipsychotic formulation.

Συμπεράσματα

- Το ποσοστό των ασθενών με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας που λάμβαναν θεραπεία με ΕΑΜΔ ήταν σχεδόν τριπλάσιο από ότι έχει καταγραφεί προηγουμένως στη χώρα μας και υψηλότερο από αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρονται σε άλλες χώρες.
- Οι ασθενείς στην ελληνική επαρχία έχουν επαρκή πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες με δεύτερης γενιάς ΕΑΜΔ.
- Απαιτείται περαιτέρω έρευνα ως προς τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της θεραπείας με ΕΑΜΔ σε περιοχές της ελληνικής επαρχίας και ως προς την αναζήτηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυτή τη θεραπεία.

Βιβλιογραφία

Kane, J.M.; McEvoy, J.P.; Correll, C.U.; Llorca, P.-M. Controversies Surrounding the Use of Long-Acting Injectable Antipsychotic

Medications for the Treatment of Patients with Schizophrenia. CNS Drugs 2021, 35, 1189–1205.